



*Rosa Dumetorum.*

*P. A. Redouté pinx.*

*Rosier des Buissons.*

*Superintendant de Remond.*

*Chapuy sculp.*

**ROSA DUMETORUM.**

*R. rosea glabra; aculeis infra folia geminis, setosis, cuneatis; foliis pubescentibus; petalis minus passim incisis; foliis sub orbiculato-ovatis; 5-7; fructibus glabris perispermatis; glabris.*  
*Fl. de Paris*, éd. 2, p. 250. *DC. Fl. franc.* vol. 3, vol. 6, p. 553. *Arv. Hist. Ros. quib. et des 1<sup>re</sup> ed. vol. 1, p. 573.* *Boiss. Engl. Bot. Tab. 2579.* *Walt. Fl. Ind. p. 85.*

*R. (Cinnia) var. 1. Dorr. Ency. 6, p. 288.*

*R. (Cinnia) var. 2. DC. Fl. vol. 2, p. 526.*

*R. (Cinnia) var. 3. Rose Fl. M. et L. p. 184.*

*R. (Arvensis) Wivel. Fl. Herb. p. 263.*

*R. (Collina) Wallr. Ann. bot. p. 87. Exclut. specim. pleuroque. Fl. Ros. 1, 2.*

*R. (Collina dumetorum) Rose. Ros. vol. 1, p. 14, var. 1.*

**LE ROSIER DES BUISSONS.**

**DESCRIPTION.**

Arbuste assez commun dans les bois et dans les haies aux environs de Paris. On le trouve aussi dans les contrées septentrionales de l'Europe. Il s'élève, en un buisson rampant, à la hauteur de trois, de quatre, et souvent de six pieds. Ses rameaux, absolument glabres, sont armés d'aiguillons crochus, quelques-uns écartés, mais presque toujours disposés deux par deux près des stipules. Les feuilles se composent de cinq, plus rarement de sept folioles ovales, arrondies, vertes et glabres au-dessus, plus pâles et tomenteuses au-dessous, en général